

## DAY SURGERY

Responsabile Dr. Pasquale Piazzolla

## U.F. UROLOGIA

Responsabile Dr. Carmelo Morana

Tel. 0422-896722

MOD-AMB. 06 Rev. 12- 29/03/23 Pagina 1 di 2

## ISTRUZIONI PER L' ESECUZIONE DI AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE ECOGUIDATA

Per il medico curante e per il paziente

**IL PAZIENTE È INVITATO AD ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE NORME SOTTORIPORTATE**

La biopsia prostatica viene eseguita in regime ambulatoriale. È preferibile la presenza di un accompagnatore per l'eventuale impossibilità alla guida di veicoli nelle ore successive all'indagine.

**Effettuare o portare l'esito dei seguenti ESAMI EMATOCHIMICI (eseguiti al massimo 1 mese prima della biopsia):**

- Emocromo
- PT (tempo di protrombina o tempo di Quick)
- PTT (tempo di tromboplastina parziale)
- INR
- PSA (antigene prostatico specifico) - ultimo controllo eseguito)
- ESAME URINE E UROCULTURA

**Segnalare sempre all'Urologo eventuali allergie a farmaci, anestetici locali, latticose e l'eventuale assunzione di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti che diminuiscono la capacità di coagulazione del sangue (es. Aspirina, Tiklid, Persantin, Eparina, Coumadin, Sintrom, etc.)**

**Il paziente in terapia con anticoagulante o antiaggregante (Coumadin, Aspirina ecc.) dovrà sospendere la terapia secondo le indicazioni del centro di riferimento o seguendo il seguente schema:**

- **TICLOPIDINA:** sospenderla, 14 gg e se non presenta allergie sostituirla con Cardioaspirin 100 mg 1 cp/die che va sospeso 5 gg prima.
  - **ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina):** sospendere 5 giorni prima
  - **COUMADIN o SINTROM:** sospendere 7 giorni prima e sostituire con SELEPARINA 0,4 ml 1 fiala sottocute (l'ultima somministrazione deve essere effettuata 24 ore prima). In caso di alto rischio trombo-embolico, secondo il dosaggio concordato con lo specialista di riferimento, per l'esecuzione dell'esame, l'ultima somministrazione deve essere effettuata al massimo 12 ore prima.
  - **NAO:** Apixaban (Eliquis), Dabigatran Etexilato (Lixiana), Edoxaban (Pradaxa), Idarucizumab (Praxbind), Rivaroxaban (Xarelto), sospendere 48 ore prima.
- Nei casi di pazienti in terapia con Coumadin, Sintrom o NAO, il controllo del PT e PTT deve essere effettuato il giorno prima della biopsia.

**Il paziente affetto da condizioni cardiache a rischio di sviluppare endocardite batterica, oltre alla profilassi specifica per la procedura, deve seguire lo schema di profilassi a pag. 2.**

**In caso di mancata esecuzione delle istruzioni sotto-riportate, l'esame dovrà essere necessariamente posticipato.**

**1. La SERA PRECEDENTE** all'esame, assumere una cena leggera ed eseguire un microclisma evacuativo di pulizia. **Assumere 1 busta di antibiotico FOSFOMICINA 3g (prima di coricarsi e dopo aver vuotato la vescica).**

**2. Il GIORNO DELL'ESAME** assumere una **colazione leggera**. Ripetere a domicilio il microclisma evacuativo. **Assumere 1 busta di antibiotico FOSFOMICINA 3g (3 ore prima dell'esecuzione dell'esame).**

# OSPEDALE GIOVANNI XXIII

Casa di Cura Privata Accreditata S.S.N.  
Presidio Ospedaliero dell'Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA  
31050 MONASTIER di TREVISO (TV) - Via Giovanni XXIII, 7  
**WWW.GIOVANNI23.IT** cup@giovanni23.it - 0422.8961



MOD-AMB. 06 Rev. 12- 29/03/23 Pagina 2 di 2

## DAY SURGERY

Responsabile Dr. Pasquale Piazzolla

## U.F. UROLOGIA

Responsabile Dr. Carmelo Morana

Tel. 0422-896722

Presentarsi all'ora indicata, presso l'Ufficio Cassa muniti di:

PRESTAZIONE IN REGIME SSN	PRESTAZIONE IN REGIME LIBERA PROFESSIONE
n. 1 ricetta SSN del Medico Curante con la dicitura <b>- cod. 60.11 agobiopsia ecoguidata della prostata (nel campo "prescrizione")</b> <b>- n. 1 (nel campo "quantità")</b>	Richiesta dello Specialista con la seguente dicitura: <b>agobiopsia ecoguidata della prostata + esame istologico di biopsia prostatica</b>
n. 1 ricetta SSN del Medico Curante con la dicitura <b>- cod. 91. 44.1 esame istologico di biopsia prostatica (nel campo "prescrizione")</b> <b>- n. 8 (nel campo "quantità")</b>	

Si ricorda di portare con sé:

### Gli esami ematochimici prescritti

**Una bottiglia di acqua (almeno 1,5 l.) al fine di iniziare l'assunzione di abbondanti liquidi dopo l'esecuzione dell'esame e proseguire per i successivi 3 giorni (almeno 2 litri /al giorno)**

### PER I DUE GIORNI SUCCESSIVI ALL'ESAME

**Assumere 1 busta di antibiotico FOSFOMICINA 3 g la sera a vescica vuota.**

Dopo la biopsia è consigliabile riposo per 48 ore.

Se non si verificano complicazioni il paziente potrà tornare alle consuete attività dopo due giorni. In caso di sanguinamento profuso, febbre elevata (maggiore di 38°C), difficoltà ad urinare o per qualsiasi necessità telefonare al numero **0422896562** (infermieri ambulatori) dalle 08.00 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì) o al n. **0422896722** (reparto di Chirurgia/Urologia).

## PROFILASSI DELL'ENDOCARDITE BATTERICA

Per i pazienti affetti dalle patologie cardiache di seguito elencate sottoposti a determinate procedure tra le quali la biopsia prostatica, è raccomandata la profilassi antibiotica per la prevenzione dell'endocardite batterica come da schema indicato:

### Pazienti a rischio elevato di endocardite

(pregressa endocardite, portatori di protesi valvolari cardiache, cardiopatie congenite complesse- tetralogia di Fallot e altre forme cianogene complesse, difetto interventricolare, stenosi aortica congenita, bicuspidia aortica.

Amoxicillina (o ampicillina) 2 g ev + gentamicina 3 mg/Kg im o ev 30 min/1 ora prima della procedura. Dopo 6 ore Amoxicillina (o ampicillina) 1 g. x os e proseguire con 1 gr x 2 al dì per 3 gg.  
Nei soggetti allergici Clindamicina 600 mg. 1-2 ore prima della procedura +gentamicina 3 mg/Kg ev o im

### Pazienti a rischio moderato di endocardite

Valvulopatie acquisite (malattia reumatica, valvulopatia aortica, insufficienza mitralica), prollasso mitralico con ispessimento, calcificazione o degenerazione mixomatosa dei lembi, insufficienza valvolare, cardiopatie congenite non cianogene, cardiomiopatia ipertrofica

Amoxicillina (o ampicillina) 2 g ev entro 30 min/1 ora prima della procedura, o per via orale 1 g X 2 al dì iniziando 24 ore prima della procedura e proseguendo per 3 giorni.  
Nei soggetti allergici, Clindamicina 600 mg. 1-2 ore prima della procedura ev o im

In caso di impossibilità a sottoporsi all'indagine si prega di dare comunicazione di disdetta con preavviso di almeno 48 ore dalla data dell'appuntamento, telefonando ai numeri indicati nel foglio della prenotazione.