

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Responsabile Dr. Mauro Gallo

Tel. 0422 896710

E-mail: radiologia@giovanni23.it

Allegato N1 RAD6/7 rev.01 del 11/2022 Pag.1 di 1

INDICAZIONI PER PAZIENTI SOTTOPOSTI AD ESAME TC/RM CON MEZZO DI CONTRASTO

Per eseguire un esame diagnostico con mezzo di contrasto, è necessario effettuare un'adeguata anamnesi e una completa compilazione del modulo **Informativa e consenso Tac e RM con mezzo di contrasto:**

- Obbligatorio eseguire esame del sangue della creatinina e GFR, per una corretta identificazione di possibili problemi renali;
- di seguito la tabella con i valori di riferimento del GFR secondo le linee guida ESUR

GFR > 90	normale
GFR 60/90	lieve, più bassa
GFR 59/30	più bassa del normale
GFR 29/15	molto più bassa del normale
GFR < 15	insufficienza renale

Si raccomanda inoltre di segnalare le seguenti condizioni di rischio prima di eseguire l'esame:

- digiuno da almeno 4 ore;
- storia clinica di nefropatia;
- interventi chirurgici a carico di reni, testa, occhi (cataratta data intervento), cuore;
- diabete mellito tipo 1 e 2, sospendere Metformina il giorno prima dell'esame e il giorno dell'esame;
- eventuali allergie pregresse al mezzo di contrasto o reazioni anafilattiche importanti;
- per eventuali premedicazioni, contattare anche la struttura.

IMPORTANTE PORTARE SEMPRE DOCUMENTAZIONE COMPLETA (visite specialistiche, esami del sangue, esami diagnostici)**A esame concluso seguire le seguenti raccomandazioni:**

- far trascorrere almeno 7 giorni tra due somministrazioni di mezzo di contrasto;
- in caso di creatinina alterata pre esame, ripetere il dosaggio di GFR e creatinina dopo 48/72 ore dall'esame;
- per i pazienti che hanno sospeso la Metformina, riprendere la terapia dopo 24h;
- eseguire idratazione con almeno 2 litri di acqua;
- per i pazienti a cui sono stati somministrati farmaci (tranquillanti, antistaminici) durante l'esecuzione dell'esame, si raccomanda di non guidare e di non assumere bevande alcoliche per almeno 12 ore;
- potrebbero manifestarsi reazioni allergiche tardive al mezzo di contrasto; di seguito si riporta tabella con eventuali sintomi che si potrebbero presentare e il comportamento da attuare. Invitiamo a contattare il nostro servizio di radiologia.

Segno/ sintomo	Insorgenza	Trattamento
Reazione cutanea (eritema, pomfi, prurito)	Entro poche ore- solitamente di entità lieve/ moderata; possono regredire spontaneamente	Antistaminico per via orale, pomata cortisonica, cortisone
Nausea, vomito, cefalea, dolori muscolari, febbre	Entro poche ore e fino a una settimana dopo (non sempre è comprovata la correlazione con l'introduzione del mezzo di contrasto).	Antiemetico, antidolorifico; contattare il medico di famiglia; recarsi al pronto soccorso